

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11 - 6 - 79128870
N° 145 - 8 JUIN 1979 2

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE des STATIONS d'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDÈCHE, DROME, ISÈRE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ABONNEMENT ANNUEL: 60 F

C.C.P. LYON 9431-17

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3 Répondeurs : (78) 60.17.74
Tél. (78) 62.20.30 (Postes 426 et 427) Ardèche-Drôme : (75) 43.34.36

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.
55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

/ V I G N E /

MILDIOU - En toutes régions la protection devra être renouvelée d'urgence si cela n'a pas été fait à la suite des derniers orages. Utiliser un produit efficace contre le BLACK-ROT dans les secteurs où cette maladie est présente.

OIDIUM - Assurer une protection parfaite, même sur les cépages moyennement sensibles.

TORDEUSES DE LA GRAPPE - La protection par des produits à caractère curatif doit être maintenue dans les vignobles de l'Ain et des parties hautes du Sud du Beaujolais.

/ A R B R E S F R U I T I E R S /

TAVELURES - Même dans les régions les plus précoces, on ne peut envisager d'interrompre la protection avant le 15 ou même le 20 Juin.

TORDEUSE ORIENTALE - Aucun traitement n'est pour l'instant nécessaire.

CARPOCAPSE - Un traitement ne s'impose que sur les arbres peu chargés en fruits et dans les seules régions 102, 107, 123 et 151 où les populations sont un peu moins faibles qu'ailleurs. Il sera appliqué entre le 11 et le 13 Juin avec les produits classiques, dès réception avec le DIFLUBENZURON (Dimilin).

MOUCHE DE LA CERISE - Les populations étant en nette recrudescence, une intervention s'imposera au changement de couleur du fruit dans toutes les zones où ce stade n'est pas encore atteint.

/ G R A N D E S C U L T U R E S /

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE - Les prochaines contaminations risquent d'être assez sévères, de sorte qu'un traitement s'impose sur toutes les parcelles ayant atteint le stade "fanes confluentes".

DORYPHORE - Surveiller les parcelles et intervenir dès l'apparition de nombreuses larves.

PUCERONS DES CEREALES - Surveiller les populations et intervenir dès que la moitié des épis porte au moins 5 pucerons par épi.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Rhône-Alpes"

R. GIREAU

Imprimerie de la station Rhône-Alpes - Le Directeur Gérant P. JOURNET - CPPAP 477 AD

7344